

# くすりのしおり

内服剤

2026年04月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 製品名：パキロビッドパック 600

**主成分：**1. ニルマトレルビル錠；ニルマトレルビル（Nirmatrelvir）  
2. リトナビル錠；リトナビル（Ritonavir）

**剤形：**1. ニルマトレルビル錠；淡赤色の錠剤、長径 17.5mm、短径 8.5mm、厚さ 5.7mm/2. リトナビル錠；白色の錠剤、長径約 17mm、短径約 9mm、厚さ約 6mm

**シート記載など：**パキロビッドパック 600、リトナビル、100mg、朝服用分、同時に 3 錠、ニルマトレルビル、150mg、600、社マーク、Pfizer、Paxlovid PACK 600、夕方服用分、同時に 3 錠、PFE、3CL、R9、H

剤形写真準備中

## この薬の作用と効果について

抗ウイルス剤と呼ばれるグループに属する薬で、ニルマトレルビルが新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）のメインプロテアーゼを阻害することにより、ウイルスの増殖を抑制します。リトナビルはニルマトレルビルの代謝を阻害することにより、ニルマトレルビルの血漿中濃度を増加させます。通常、新型コロナウイルスによる感染症の治療に用いられます。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。HIV 感染、腎機能障害、肝機能障害がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人および6歳以上かつ体重40kg以上の小児は、ニルマトレルビル錠1回2錠（主成分として300mg）、リトナビル錠1回1錠（主成分として100mg）を同時に1日2回、5日間服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・シート1枚には1日分（朝および夕方の2回分）が含まれています。
- ・錠剤をかんだり、割ったり、砕いたりせずに服用してください。
- ・飲み忘れた場合は、通常服用する時間から8時間以内に気がついた時、すぐに1回分を飲んでください。通常服用する時間から8時間を超えた場合には飲まずに、次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- ・この薬の作用を弱めることがありますので、セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含む食品の摂取は避け、タバコ（喫煙）は控えてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、味覚不全、下痢・軟便などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・全身けん怠感、食欲不振、吐き気 [肝機能障害]
- ・高熱、口唇びらん・目の充血・のどの痛み、皮膚・粘膜の発赤・水疱 [中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群]
- ・呼吸困難、じんま疹、全身のかゆみ [アナフィラキシー]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄方法がわからない場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。