



## シートの記載

パキロビッド®パック300のシートには、目立つように「300」と記載されています。また、朝服用分と夕方服用分がわかるようになっていきますので、それぞれ適切に服用してください。



パキロビッド パックの服用後に、下記の症状が出たり「いつもと違う」など気になることがある場合は、**医師、看護師または薬剤師にご相談ください。**



疲れやすい、体がだるい、力がはいらぬ、吐き気、食欲不振 など

➡ 肝機能障害の可能性がります

広範囲の皮膚が赤くなり水ぶくれが多発する、発熱、粘膜のただれ など

➡ ちゅうどくせいひょうひえしゆうかいしやう中毒性表皮壊死融解症の可能性がります

発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する など

➡ ひふねんまくがんしやうこうぐん皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群) の可能性がります

全身のかゆみ、じんましん、喉のかゆみ、ふらつき、どうき動悸、息苦しさ

➡ アナフィラキシーの可能性がります

### その他

- 味覚不全
- 下痢・軟便
- 悪心
- 嘔吐
- 消化不良
- 胃食道逆流性疾患
- めまい
- 高血圧
- 肝機能検査値異常
- 発疹
- 筋肉痛
- 過敏症 (じんましん、かゆみ、皮膚の赤み・腫れ、のどのつかえ)
- 腹痛
- 倦怠感
- 頭痛

など